

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 2 maggio 2017

Melo: Sono previste precipitazioni ancora per domani e dopodomani; se si è trattato sabato si consiglia di ripetere solo un trattamento di copertura possibilmente con Ohayo o Banjo a 60-70 ml/hl; se sabato non si è trattato si consiglia di aggiungere anche un sistemico come Score o Thiocur. Nei frutteti non colpiti dalle gelate si può procedere con i diradi a base di benziladenina (Brancher) in miscela con acido, o Brevis. Per un buon funzionamento di Brevis in particolare è necessario che le temperature di notte siano non inferiori ai 10 °C e possibilmente che ci sia una copertura del cielo per qualche giorno dopo l'intervento.

Vite: le condizioni di piovosità dei giorni scorsi non sono state particolarmente predisponenti per le infezioni di peronospora, viste le temperature troppo basse. Dal punto di vista cautelativo, considerando anche che poverà nei prossimi giorni, si consiglia di effettuare il primo trattamento nei vigneti della bassa valle più avanti come sviluppo vegetativo entro sabato 6, nei vigneti più in ritardo e nelle zone in quota indicativamente entro i primi giorni della prossima settimana. Utilizzare per il primo trattamento Forum MZ, Forum R 3B, Pergado SC in miscela con rame o

mancozeb, possibilmente in aggiunta con fosfito di potassio. Attenzione: con le basse temperature del mattino il rame può scottare la vegetazione. Per l'oidio usare 300-350 g/hl di zolfo bagnabile e se le temperature aumentano, aggiungere Scudex, Domark o Thiocur.