

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di mercoledì 2 maggio 2018

Melo: Le precipitazioni di sabato e domenica scorsi hanno determinato le condizioni per un'infezione di ticchiolatura. Chi non aveva trattato preventivamente deve intervenire entro questa sera con Delan o Poliram in miscela con un sistemico come Thiocur o Score. Eventualmente aggiungere anche zolfo. Le condizioni meteo della scorsa settimana infatti sono state molto predisponenti per l'oidio. Utilizzare dosaggi di prodotti coprenti che siano sufficienti anche a garantire un certo effetto preventivo, perché sono ancora previste precipitazioni. Per i diradi si possono utilizzare i prodotti a base di amide su Golden e Gala nelle fasce alte che sono a inizio caduta petali. Nelle altre zone nei prossimi giorni si può proseguire con i diradi a base di acido e Brancher, oppure Brevis. In presenza di fioriture del melo e dell'erba sottostante sono tassativamente vietati i trattamenti insetticidi.

I biologici, in previsione di deboli precipitazioni o turni irrigui possono intervenire con un trattamento a base di Thiopron che assicura una certa azione preventiva sulla ticchiolatura. Successivamente potranno intervenire con polisolfuro a seconda dell'intensità delle bagnature e dei dilavamenti.

Vite: le precipitazioni dei giorni scorsi hanno determinato condizioni per la germinabilità delle spore, ma è necessaria un'altra pioggia per causare l'infezione primaria.

Pertanto si consiglia di effettuare un primo intervento antiperonosporico in miscela con un antioidico indicativamente la prossima settimana, **ed entro sabato 12-domenica 13.**

Come antiperonosprico si consiglia un prodotto come Forum MZ , Pergado MZ, o Mildicut con l'aggiunta di rame. Come antioidico aggiungere zolfo bagnabile o zolfo liquido a dose media (250-350 g/hl).