

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



FONDAZIONE
FOJANINI
DI STUDI
SUPERIORI

Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 3 aprile 2018

Melo: si consiglia di effettuare un trattamento, possibilmente entro oggi, con rame a 150/200 g/hl oppure metiram (Polyram) alla dose massima di 2 Kg/ha+ Chorus o Scala, sia perché le precipitazioni di giovedì e venerdì hanno dilavato il trattamento precedente, e c'erano le condizioni per una prima infezione di ticchiolatura, sia perché sono ancora previste precipitazioni per domani. Trattando con temperature sufficientemente alte è possibile aggiungere l'olio e un prodotto contro la psilla del melo per il problema degli scopazzi, a base di clorpirifos etile (attenzione ai prodotti che riportano l'avversità in etichetta, massimo 1 trattamento in prefioritura) come Dursban o Terial, oppure anche Spada o Trebon up. Sono ammessi anche i Sali potassici di acidi grassi (es. Flipper).