

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 4 maggio 2017

Melo: Le precipitazioni di questi giorni hanno determinato condizioni predisponenti per infezioni di ticchiolatura e hanno causato anche forti dilavamenti, essendo caduti circa 60 mm di acqua da lunedì. Chi non aveva trattato nei giorni scorsi deve assolutamente intervenire entro domani con Delan a 70 g/hl oppure Banjo o Ohayo a 60-70 ml/hl con l'aggiunta di un sistemico come Score.

Chi è riuscito a trattare martedì, deve ripetere domani solo una copertura con Delan, Ohayo o Banjo in previsione di nuove precipitazioni del fine settimana.

Le aziende che non hanno ancora eseguito l'aficida postfiorente possono intervenire domani con tempo stabile e temperature più alte.

Sono stati catturati i primi adulti di Carpopapsa nelle trappole in alcune postazioni, pertanto per settimana prossima occorrerà effettuare l'insetticida specifico.

Vite: Con le piogge di questi giorni si stanno verificando le condizioni per la prima infezione di peronospora, ma prima di effettuare qualunque trattamento aspettare che le temperature risalgano e il tempo si stabilizzi. Potendo si consiglia di intervenire domani o entro sabato nelle zone più avanti come sviluppo vegetativo, con possibilità di arrivare anche entro il 10-12 maggio in caso di basse temperature persistenti e alle quote altimetriche più elevate.

Per la peronospora intervenendo a temperature basse si consiglia un citotropico come Pergado SC in miscela con mancozeb o rame, o Forum MZ; Per le zone più precoci e intervenendo la prossima settimana se le temperature risalgono si può già utilizzare un sistemico, come Ridomil MZ, Ridomil Gold combi o R6 trevi. Per l'oidio usare una dose di zolfo bagnabile di 250-300 g/hl o zolfo liquido e aggiungere un sistemico come Prosper o Domark, Topas e analoghi solo se le temperature si alzano.