

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di martedì 8 maggio 2018

Melo: i temporali di domenica hanno determinato condizioni favorevoli ad un'infezione di ticchiolatura. Inoltre negli incolti si sono già viste macchie diffuse. **Si raccomanda pertanto di tenere alta l'allerta sul fungo** e se non si era intervenuti nei giorni immediatamente precedenti la pioggia, intervenire il prima possibile, indicativamente entro questa sera, con Delan a dose piena, altrimenti entro domani con un coprente in miscela con un sistemico. Ci sono anche diffuse infezioni di oidio, pertanto si raccomanda di intervenire con dei sistemici o con dello zolfo, ad esempio Thiopron a dose alta. L'aggiunta di Thiopron aiuta anche contro la ticchiolatura.

I biologici, in previsione di deboli precipitazioni o turni irrigui possono intervenire con un trattamento a base di Thiopron che assicura una certa azione preventiva sulla ticchiolatura. Successivamente potranno intervenire con polisolfuro a seconda dell'intensità delle bagnature e dei dilavamenti.

Vite: Le precipitazioni della settimana scorsa hanno determinato le condizioni favorevoli alla prima infezione di peronospora. Pertanto si consiglia di effettuare un primo intervento antiperonosporico in miscela con un antioidico possibilmente entro questa settimana, **entro domenica 13. Visto che il meteo non è molto stabile, se non si riesce ad intervenire con le condizioni meteo ottimali, piuttosto è meglio rimandare ai primi giorni della settimana prossima, onde evitare dilavamenti o trattamenti fatti su vegetazione bagnata.**

Come antiperonosporico si consiglia un prodotto come Forum MZ , Pergado MZ, Valis M, Mildicut con l'aggiunta di rame. Eventualmente aggiungere un concime a base di fosfito di potassio, che ha azione anche antiperonosporica. Come antioidico usare zolfo bagnabile o zolfo liquido a dose media (250-350 g/hl), eventualmente con l'aggiunta di Prosper o Veliero, o un sistemico convenzionale come Domark o Thiocur che consentono di allungare i turni di intervento.