

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 13 aprile 2018

Melo: le piogge dei giorni scorsi sono state dilavanti e hanno creato condizioni favorevoli alle infezioni di ticchiolatura. Inoltre c'è stato anche un certo accrescimento vegetativo. Chi ha trattato lunedì può intervenire entro sabato con Delan a 50 g/hl unitamente a Chorus a 50 g/hl o Scala a 75 g/hl, chi ha trattato prima deve intervenire con un sistemico come Score, unitamente a 50 g/hl di Delan.

Chi è riuscito a trattare mercoledì non deve intervenire curativamente, ma è opportuno che rifaccia un trattamento preventivo perché sono ancora previste precipitazioni per la prossima settimana. Si può utilizzare Delan, oppure Delan pro o Polyram.

Aggiungere il prodotto aficida prefiorale se non è stato fatto, facendo attenzione alle zone e varietà dove sta iniziando la fioritura, es. su Pink Lady nelle zone precoci (parti basse dei conoidi ecc.). **E' tassativo tagliare l'erba nei frutteti per evitare la presenza di fioriture quando si effettua l'insetticida, allo scopo di rispettare i pronubi.** E' possibile aggiungere anche Nimrod o Cidely per l'oidio.

I biologici possono intervenire con vegetazione bagnata con Polisolfuro di calcio alla dose di 20-25 Kg/ha entro 25-30 ore dall'inizio dell'infezione. Per i biologici è ammesso l'uso di azadiractina come aficida.