

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 13 luglio 2018

Melo: Si possono allungare i turni di copertura dei meleti fino a 14-15 giorni. Attenzione a quei frutteti che presentano una ripartenza di infezioni su foglia con rischio di ticchiolatura tardiva. Questi necessitano di trattamenti più ravvicinati, cercando di rinnovare le coperture dopo piogge consistenti o turni irrigui. In questo periodo dare la preferenza a Captano (Merpan ecc.) Aggiungere il calcio per la butteratura.

Controllare l'eventuale presenza di fori di penetrazione di Carpocapsa. Nelle zone non confusionate, al superamento di 5 frutti bacati su mille si consiglia di usare un insetticida abbattente, come Reldan, Affirm, Spada oppure Coragen. Attenzione ai frutteti sotto confusione che però confinano con frutteti non confusionati. Comunicare al tecnico di riferimento l'eventuale presenza di bacato.

Vite: l'andamento meteo attuale è meno **favorevole alla peronospora**. Si possono quindi allungare leggermente i turni di intervento fino a 14-15 giorni. In caso di

bassa presenza di malattia, usare un prodotto come Ampexio, Presidium one, eventualmente con aggiunta di rame, oppure dimetomorf e rame (Forum R, Quantum R ecc.), Pergado R, Mildicut con aggiunta di rame. In caso di presenza più preoccupante di malattia, o ripartenze di infezioni su foglia, si consiglia dimetomorph e rame, sia in uno dei formulati già pronti (Forum R, Quantum R ecc.) o una miscela estemporanea di dimetomorph (Forum puro) e rame. Attenzione i preparati a base di rame e dimetomorph presentano un'ampia variabilità nel contenuto di rame.

Oidio: si consigliano Arius, Flint, Quadris in miscela con zolfo bagnabile o liquido alla dose di 250-350 g/hl. In caso di presenza di black rot usare Quadris o Flint. Con presenza di infezioni di oidio si consiglia Cidely in miscela con 400-500 g/hl di zolfo.

Trattamenti contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata

In questi giorni si può ancora effettuare il secondo trattamento insetticida nella parte bassa della valle fino a Sondrio, mentre per il trattamento unico nella parte alta, da Montagna Valtellina a Tirano la finestra utile è ormai stata superata perché era l'ultima decade di giugno. Se non è ancora stato fatto cercare di eseguirlo nel più breve tempo possibile. Nelle zone confusionate c'è l'obbligo di un solo trattamento insetticida. Prodotti utilizzabili in questo periodo: quelli a base di clorpirifos metile, oppure Epik o Actara. Se ci sono problemi di tignoletta usare clorpirifos. Tra i prodotti a base di clorpirifos quello che dà meno problemi di odori è Reldan LO.