

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 14 maggio 2018

Melo: si raccomanda di mantenere alta l'allerta sulla ticchiolatura perché sono state segnalate macchie di infezione primaria in alcuni frutteti.

Intervenire quanto prima nei prossimi giorni utilizzando Delan, o metiram o fluazinam (Ohayo, Banjo ecc.) in miscela con un sistemico come Score o Thiocur. Attenzione: sono ammessi fino a 4 interventi con sistemici all'anno, tranne che per alcune molecole per le quali sono consentiti 2 trattamenti. Nei prossimi giorni è possibile iniziare, in assenza di infezioni, con Fontelis o Sercadis. Per l'oidio sfruttare l'attività dei sistemici IBE oppure intervenire con zolfi.

Quando il meteo si ristabilizzerà sarà possibile effettuare il primo trattamento insetticida per la carpocapsa. prodotti consigliati: Coragen oppure Prodigy.

Vite: Chi non è riuscito a intervenire nei giorni scorsi con il primo trattamento deve intervenire il più presto possibile, anche perché sono state già segnalate in alcuni

vigneti macchie di peronospora primaria. Si può utilizzare un prodotto come Forum MZ , Pergado MZ, Valis M, Mildicut con l'aggiunta di rame ed eventualmente di fosfito di potassio, oppure un prodotto contenente fosfonato, come Enervin pro.

In alternativa si può già usare un sistemico come Ridomil MZ, Ridomil con rame o con folpet, oppure R6 trevi o Electis trio.

Per l'oidio usare zolfo bagnabile o zolfo liquido a dose media (250-350 g/hl), eventualmente con l'aggiunta di Prosper o Veliero, o un sistemico convenzionale come Domark o Thiocur che consentono di allungare i turni di intervento.

Solo in caso di forte presenza di oidio l'anno scorso si consiglia Karathane star a 40-60 ml/hl senza zolfo.