

# Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 512958 - 0342 513449  
[www.fondazionefojanini.it](http://www.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di mercoledì 17 maggio 2017

**Melo:** si rende necessario ripristinare le coperture fungicide perché le piogge di venerdì scorso di notte sono state abbondanti e dilavanti. Utilizzare Fontelis a 70-75 ml/hl oppure Banjo 60-70 ml/hl o Delan 70 WG a 50 g/hl. Aggiungere un prodotto insetticida contro la Carpocapsa. Si osservano voli nelle zone critiche e pertanto si rende necessario trattare in questi giorni, entro metà settimana prossima. Il primo trattamento è consigliato anche nei frutteti sotto confusione. Prodotti utilizzabili: Coragen, Dimilin, Prodigy. Clorpirifos etile ormai non è più utilizzabile per problemi di residuo. Calypso è ammesso in seconda generazione. I produttori biologici possono utilizzare Madex.

**Vite:** le piogge del fine settimana scorso sono state fortemente dilavanti. Al momento sono state segnalate sporadiche macchie d'olio in bassa valle, pertanto significa che sono state infettanti le piogge dei primi di maggio. Inoltre le temperature in aumento favoriscono la comparsa di macchie perché accorciano i

tempi di incubazione. Negli interventi si raccomanda di rispettare accuratamente i turni indicati in etichetta. Chi è intervenuto da 10 a 12 giorni fa con soli coprenti o citotropici è ormai al limite della copertura e deve ripetere l'intervento. Chi è intervenuto invece con sistemici è maggiormente coperto, e può aspettare anche 14 giorni prima di intervenire, ma senza andare oltre. Contro la peronospora si possono utilizzare sistemici come Ridomil MZ, Ridomil R, R6 trevi, Electis trio . In alternativa anche Valis F o Valis M. Per l'oidio usare zolfo bagnabile a 250-300 g/hl con l'aggiunta di un sistemico come Domark, Topas, Thiocur ecc.