

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 18 maggio 2018

Melo: il potenziale di spore per le infezioni primarie di ticchiolatura è ormai in via di esaurimento. Tuttavia si raccomanda di mantenere alta l'allerta sulla ticchiolatura perché sono state segnalate macchie di infezione primaria in alcuni frutteti. Inoltre l'accrescimento vegetativo è notevole.

Dato il meteo assolutamente instabile si raccomanda di rinnovare le coperture. In questo periodo si può ancora usare Delan, oppure passare a Fontelis o Sercadis o uno dei prodotti a base di fluazinam (Ohayo, Banjo, Nando). Attenzione ai limiti sul numero dei trattamenti consentiti. Con i sistemici sono ammessi 4 trattamenti complessivi.

In presenza di andamento meteo stabile è possibile aggiungere l'insetticida: in questo periodo si possono utilizzare Coragen, Prodigy oppure il virus della granulosa (Madex top o Madex twin).

Vite: le condizioni meteo molto variabili con frequenti temporali serali localizzati sono assolutamente favorevoli alle malattie, in particolare alla peronospora. Quest'anno la comparsa di macchie in alcuni vigneti è stata particolarmente precoce, e risale al 10 maggio. In queste condizioni altamente instabili si raccomanda di mantenere la copertura dei vigneti, ed eventualmente accorciare i turni degli interventi. In questa fase si può passare all'uso dei sistemici come Ridomil in una delle sue formulazioni con rame, mancozeb o folpet. In alternativa è possibile usare R6 albis, R6 trevi, Electis trio, Melody trio. Con i sistemici si possono tenere intervalli di 12-14 giorni. Con i prodotti contenenti fosetyl possibilmente non andare oltre i 12 giorni.

Oidio: le condizioni sono predisponenti soprattutto in concomitanza di giornate calde che seguono alle precipitazioni temporalesche. In questa fase usare Prosper, oppure un sistemico convenzionale come Topas, Domark o Thiocur, o prodotti generici analoghi. Aggiungere sempre zolfo bagnabile o liquido ad almeno 300-350 g/hl. Sono state segnalate macchie di black rot; in questi casi usare un prodotto contenente mancozeb, oppure Thiocur o Score.