

# Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio  
Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada  
aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 512958 - 0342 513449  
[www.fondazionefojanini.it](http://www.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di martedì 18 luglio

### Melo:

Contro la ticchiolatura si rende necessario ripristinare le coperture fungicide ogni 15-18 giorni in previsione di piogge o dopo forti dilavamenti. Usare Dodina o Captano. Per l'oidio utilizzare Cidely o Arius con aggiunta di zolfo bagnabile.

**Attenzione alla deriva sulle Gala e ai tempi di carenza.** Attenzione: non miscelare zolfo bagnabile e captano, la miscela è fitotossica. Nei frutteti non confusionati, se non è stato fatto si consiglia un trattamento insetticida. Prodotti utilizzabili: Coragen o Calypso. Aggiungere un concime fogliare a base di calcio contro la butteratura

**Vite:** gli attacchi di **peronospora** sono abbastanza limitati , prevalentemente sulle femminelle. L'infezione dovuta alle piogge di fine giugno è comunque importante, in quanto sui testimoni non trattati gli attacchi di peronospora sono molto forti, anche sui grappoli. Si raccomanda pertanto di tenere coperta la vegetazione. Prodotti utilizzabili: quelli a base di dimetomorph come Forum R 3B, Quantum R, Quasar R. oppure Zoxamide + rame come Agron, Electis R, oppure Pergado R. Attenzione alle

dosi di rame che sono diverse: in caso si intenda allungare i turni usare i formulati a maggior contenuto di rame.

**Oidio:** il rischio è notevolmente calato: usare zolfo bagnabile a 250-350 g/hl con l'aggiunta di Arius, Vivando o Cidely

**Black rot:** la malattia ha avuto negli ultimi giorni un particolare aggravamento, specialmente in alcuni vigneti dove era già presente precedentemente. In caso di nuove presenze di sintomi, usare rame a dose alta, es. solfato di rame a 600-700 g/hl, o ossicloruro di rame a 250-350 g/hl, e aggiungere Flint o Quadris come antioidici, che hanno un'eccellente azione sul Black rot.

Se è già stato fatto il secondo trattamento o trattamento unico contro lo *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata, non si rendono più necessari trattamenti insetticidi. Altrimenti cercare di effettuarlo il più presto possibile con prodotti come Pyrinex, Dursban, Epik, Actara.