

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di lunedì 21 maggio 2018

Melo: il potenziale di spore per le infezioni primarie di ticchiolatura è ormai in via di esaurimento. Tuttavia si raccomanda di mantenere alta l'allerta sulla ticchiolatura perché sono state segnalate diverse macchie di infezione primaria in alcuni frutteti. Inoltre l'accrescimento vegetativo è notevole.

Dato il meteo assolutamente instabile si raccomanda di rinnovare le coperture. In questo periodo si può ancora usare Delan, oppure passare a Fontelis o Sercadis o uno dei prodotti a base di fluazinam (Ohayo, Banjo, Nando). In presenza di macchie si consiglia di intervenire con un sistemico, un coprente e Thiopron che blocca le macchie, oppure anche con polisolfuro di calcio.

In presenza di andamento meteo stabile è possibile ancora aggiungere l'insetticida: in questo periodo si possono utilizzare Coragen, Prodigy oppure il virus della granulosa (Madex top o Madex twin).

Vite: le condizioni meteo molto variabili con frequenti temporali serali localizzati sono assolutamente favorevoli alle malattie, in particolare alla peronospora. In queste condizioni altamente instabili si raccomanda di mantenere la copertura dei vigneti, ed eventualmente accorciare i turni degli interventi. Si può usare un sistemico come Ridomil in una delle sue formulazioni con rame, mancozeb o folpet. In alternativa è possibile usare R6 albis, R6 trevi, Electis trio, Melody trio. Con i sistemici si possono tenere intervalli di 12-14 giorni. Con i prodotti contenenti fosetyl possibilmente non andare oltre i 12 giorni.

Oidio: le condizioni sono predisponenti soprattutto in concomitanza di giornate calde che seguono alle precipitazioni temporalesche. In questa fase usare Prosper, oppure un sistemico convenzionale come Topas, Domark o Thiocur, o prodotti generici analoghi. Aggiungere sempre zolfo bagnabile o liquido ad almeno 300-350 g/hl. Sono state segnalate macchie di black rot; in questi casi usare un prodotto contenente mancozeb, oppure Thiocur o Score.