

# Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 512958 - 0342 513449  
[www.fondazionefojanini.it](http://www.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di venerdì 25 maggio 2018

**Melo:** le infezioni primarie di ticchiolatura sono ormai in via di conclusione. Tuttavia si consiglia di mantenere alta l'allerta sulla ticchiolatura perché sono state segnalate diverse macchie di infezione primaria in alcuni frutteti. Inoltre l'accrescimento vegetativo è stato notevole.

Si raccomanda di rinnovare le coperture dopo 6/7 giorni dal precedente intervento. In questo periodo se non ci sono infezioni si può passare a Fontelis o Sercadis o uno dei prodotti a base di fluazinam (Ohayo, Banjo, Nando). Aggiungere il calcio per la butteratura. Si raccomanda di non aggiungere zolfo a Fontelis.

In presenza di macchie si consiglia invece di intervenire con un ultimo sistemico, un coprente e Thiopron che blocca le macchie, oppure anche con polisolfuro di calcio. Si può usare anche dodina ma attenzione alla fitotossicità specialmente sulle Golden

Chi non ha ancora fatto l'insetticida per la Carpocapsa, se interviene in questi giorni deve usare Calypso o un prodotto a base di clorpirifos metile.

**Vite:** l'andamento meteo dei giorni scorsi è stato particolarmente favorevole alla peronospora. In diversi vigneti infatti sono state segnalate macchie d'olio già sporulate. Si raccomanda pertanto di mantenere la copertura dei vigneti, onde evitare che le infezioni passino ai grappolini, **ed eventualmente accorciare i turni degli interventi.** Si può usare un sistemico come Ridomil in una delle sue formulazioni con rame, mancozeb o folpet. In alternativa è possibile usare R6 albis, R6 trevi, Electis trio, Melody trio. Con i sistemici si possono tenere intervalli di 12-14 giorni. Con i prodotti contenenti fosetyl possibilmente non andare oltre i 12 giorni.

In caso di presenza elevata di malattia aggiungere folpet oppure cimoxanyl

**Oidio:** le condizioni sono predisponenti soprattutto in concomitanza di giornate calde che seguono alle precipitazioni temporalesche. In questa fase usare un sistemico come Topas, Scudex, Domark o Thiocur, o prodotti generici analoghi. Aggiungere sempre zolfo bagnabile o liquido ad almeno 300-350 g/hl. Sono state segnalate macchie sporadiche di black rot; in questi casi usare un prodotto contenente mancozeb, oppure Thiocur o Score.