

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 27 aprile 2017

Melo: Le precipitazioni di questi giorni hanno apportato finora tra 32 e 38 mm di acqua, pertanto anche i trattamenti preventivi sono da ritenere quasi dilavati. In queste condizioni, si consiglia di intervenire indicativamente entro sabato, se le temperature lo consentono, con un coprente come Delan, Ohayo o Banjo miscelati con un sistemico.

Attenzione ad eseguire trattamenti aficidi, effettuarli solo quando le temperature aumentano e curare il taglio dell'erba per evitare effetti collaterali sui pronubi.

Per il dirado si consiglia di aspettare che le temperature risalgano e verificare anche l'effetto del gelo sui frutticini. Qualora si decidesse di intervenire, i diametri dei frutticini sono compatibili con interventi a base di benziladenina (Brancher) in miscela con acido, o Brevis. Per un buon funzionamento di Brevis in particolare è necessario che le temperature di notte siano non inferiori ai 10 °C e possibilmente che ci sia una copertura del cielo per qualche giorno dopo l'intervento. Attenersi per sicurezza alle dosi più basse.

Vite: Con le piogge di questi giorni si stanno verificando le condizioni per la prima infezione di peronospora, ma prima di effettuare qualunque trattamento aspettare che le temperature risalgano. Si consiglia di intervenire a partire da metà settimana prossima e indicativamente entro il fine settimana del 6-7 maggio, con possibilità di arrivare anche entro il 10-12 maggio in caso di basse temperature e alle quote altimetriche più elevate. Per la peronospora si consiglia un citotropico come Pergado o Zoxium in miscela con mancozeb o rame, Forum MZ oppure se si inizia presto, un prodotto a base di rame con eventuale aggiunta di fosfiti. Per le zone più precoci se le temperature risalgono si può già iniziare con un sistemico, come Ridomil o R6. Per l'oidio usare una dose di zolfo bagnabile o liquido elevata e aggiungere un sistemico come Prosper o Domark, Topas e analoghi solo se le temperature si alzano e se si tengono i 14 giorni tra un trattamento e il successivo.