

# Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 512958 - 0342 513449  
[www.fondazionefojanini.it](http://www.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di venerdì 27 luglio 2018

**Melo:** Si possono allungare i turni di copertura dei meleti anche oltre i 15 giorni ma occorre comunque considerare i turni di irrigazione che sono dilavanti. In questo periodo usare Captano (Merpan ecc.) Aggiungere il calcio per la butteratura. Per chi tratta dopo il 31 luglio: non usare captano sulle Gala e attenzione alla deriva. Attenzione: Captano non è miscibile con zolfo, distanziare i trattamenti di almeno 8-9 giorni.

Il controllo delle trappole evidenzia che non ci sono catture di Carpocapsa, Cydia molesta e ricamatori, pertanto non si consigliano trattamenti insetticidi. In caso di interventi tempestivi usare Affirm.

**Vite:** l'andamento meteo attuale non è particolarmente **favorevole alla peronospora anche se sono comparse in seguito alle piogge recenti, nuove macchie su foglia**. Su grappolo la situazione è stabile e non ci sono nuove infezioni. Si possono quindi allungare i turni di intervento fino a 15-17 giorni e oltre, stando

attenti ai dilavamenti e intervenendo comunque dopo 30-40 mm di pioggia. Nelle zone più tardive o dove ci sono ancora infezioni usare Ampexio, Presidium one, eventualmente con aggiunta di rame, oppure dimetomorf e rame (Forum R, Quantum R ecc.), Pergado R, Mildicut con aggiunta di rame. In caso di minore presenza o di vigne pulite, usare rame in uno dei suoi formulati, ossicloruro, idrossido o solfato, ricordando che dopo circa 30 mm è completamente dilavato.

**Oidio:** si consigliano Arius, o Vivando in miscela con zolfo bagnabile o liquido alla dose di 250-350 g/hl. Non sospendere ancora l'uso dello zolfo, almeno fino ad invaiatura completata.

Aggiungere eventualmente un concime fogliare a base di calcio o calcio-magnesio.