

Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio
Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada
aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 512958 - 0342 513449
www.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 28 luglio

Melo: Si consiglia di effettuare, dopo le piogge dilavanti del fine settimana scorso e le irrigazioni, un trattamento per rinnovare la copertura su ticchiolatura e marciumi da conservazione. Usare Captano (21 giorni carenza) oppure Flint (14 giorni carenza, efficace anche su oidio). Su Gala Captano non è più utilizzabile. Per i trattamenti di chiusura utilizzare Bellis (7 giorni di carenza) o Geoxe (3 giorni di carenza).

Carpocapsa: in alcune zone si osservano elevate catture. Si tratta di frutteti non confusionati, quindi è di fondamentale importanza effettuare dei controlli, soprattutto nella parte alta della chioma, e segnalare a un tecnico gli eventuali danni per decidere come intervenire.

Vite: la situazione fitosanitaria al momento è positiva e nei vigneti precoci si osservano già numerosi grappoli con un 10-20% di invaiatura. I trattamenti fungicidi possono essere fortemente ridotti, sia in termini di principi attivi impiegabili, sia come tempi di intervento che si possono allungare a 16-18 giorni. Nei vigneti che non hanno ancora iniziato ad invaiare si può utilizzare per un ultimo intervento, un

prodotto come Forum R, Quantum R, Quasar R, Agron, Zemix R, Pergado R. Nei vigneti in condizioni di invaiatura più avanzate si può passare ad un formulato a base di rame come Coprantol, Cuproxat, Poltiglia disperss ecc. Aggiungere un quantitativo di zolfo bagnabile o liquido di 200-250 g/hl. Per ora non utilizzare prodotti antimarciume.