

# Notiziario Tecnico

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio

Stampa: Tipolitografia Ignizio, Montagna V. (SO) - Direttore responsabile: Graziano Murada

aut. Tribunale di Sondrio n. 222 del 13/04/2002



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO  
Tel. 0342 512958 - 0342 513449  
[www.fondazionefojanini.it](http://www.fondazionefojanini.it)

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

## Comunicato di mercoledì 30 maggio 2018

**Melo:** le infezioni primarie di ticchiolatura sono ormai in via di conclusione. Tuttavia si consiglia di mantenere alta l'allerta sulla ticchiolatura perché sono state segnalate diverse macchie di infezione primaria in alcuni frutteti. Inoltre l'accrescimento vegetativo è stato notevole.

Si raccomanda di rinnovare le coperture dopo 6/7 giorni dal precedente intervento. In questo periodo se non ci sono infezioni si può usare Fontelis o Sercadis o uno dei prodotti a base di fluazinam (Ohayo, Banjo, Nando). Aggiungere il calcio per la butteratura. Si raccomanda di non aggiungere zolfo a Fontelis.

In presenza di infezioni si può usare dodina ma attenzione alla fitotossicità specialmente sulle Golden. In alternativa si può usare zolfo Thiopron a dose alta, ma attenzione non è miscelabile con Fontelis.

Chi non ha ancora fatto l'insetticida per la Carpocapsa, se interviene in questi giorni deve usare Calypso o un prodotto a base di clorpirifos metile.

**Vite:** l'andamento meteo attuale è particolarmente favorevole alla peronospora. In diversi vigneti infatti sono state segnalate macchie d'olio già sporulate e anche sintomi già sui grappolini. Si raccomanda pertanto di mantenere la copertura dei vigneti, **ed eventualmente accorciare i turni degli interventi**. Si può usare un sistemico come Ridomil in una delle sue formulazioni con rame, mancozeb o folpet. In alternativa è possibile usare R6 albis, R6 trevi, Electis trio, Melody trio. Con i sistemici si possono tenere intervalli di 12-14 giorni. Con i prodotti contenenti fosetyl possibilmente non andare oltre i 12 giorni.

**In caso di presenza di malattia aggiungere folpet oppure cimoxanil, o fare una miscela di dimetomorph e folpet**

**Oidio:** le condizioni sono predisponenti soprattutto in concomitanza di giornate calde che seguono alle precipitazioni temporalesche. In questa fase usare un sistemico come Topas, Scudex, Domark o Thiocur, o prodotti generici analoghi. Aggiungere sempre zolfo bagnabile o liquido ad almeno 300-350 g/hl.